Trigonia Strangei, in einzelnen Schalen an der Küste durchaus nicht selten, an Long Reef und bei Wollongong mitunter sogar häufig, war bis jetzt erst einmal lebend gefunden worden; ein zweites Exemplar ist nach Cox neuerdings vor dem Hafen von Port Jackson gedrakt worden. Die Art lebt offenbar tief im Schlamm und nur todte Stücke werden von den Wellen freigespült.

Literaturbericht.

Smith, *Edgar A.*, *Notes on Volutharpa Perryi.* — In Ann. Mag. N. H. 1887 Novbr.

Das britische Museum hat zwei Exemplare mit Thier von den Liukiuinseln erhalten; sie haben im Gegensatz zu Troschel's Angaben einen kleinen aber starken Deckel; der Bau ist im Ganzen wie bei Buccinum undatum, nur der Vorderrand des Fusses hat einen eigenthümlichen Vorsprung. S. hält die Art für verschieden von V. ampullacea Midd.

Holm, *Th.*, *Beretning om de poa Fyllas Togt i 1884 foretagne zoologiske Undersoegelser i Groenland.* Sep.-Abz. aus —? 8⁰. 19 pag.

Enthält die vorläufige Aufzählung der gesammelten Thiere, die Mollusken von Herrn Stud. Fred. Riise bearbeitet. Es wurden 2 Brachiopoden, 10 Lamellibranchier, 23 Gastropoden gesammelt, alles bekannte hochnordische Arten, von Landschnecken Vitrina angelicae, die aber im Moos, nicht unter Angelica-Blättern gesammelt wurde, Succinea groenlandica, Limnaea Vahlii, L. Holboelli und Planorbis arcticus.

The Journal of Conchology. Vol. V. No. 8.

p. 225. *Taylor, J. W.*, Helix arbustorum monstr. sinistrorsa in Derbyshire.

p. 226. *Smith*, *Edgar A.*, Note on the Pearly Nautilus. Das Britische Museum hat ein frisches Exemplar von den Andamanen erhalten, nebst Notizen über das Benehmen des Thieres in der Gefangenschaft. Ein paar beigefügte, in der Schale mit dem Nautilus gefundene »Parasiten« sind leider durch einen Zufall verloren gegangen; sie sollen nach den beigefügten Mittheilungen kaulquappenartig (tadpole-like) und sehr lebendig gewesen sein. Der Nautilus hatte in der Gefangenschaft im Seewasser seine Schale freiwillig verlassen und keine Lust bezeigt, sich ihrer wieder zu bemächtigen.

p. 227. *Collinge, W. E.*, Abnormal Helix aspersa.

p. 228. *Scott, Thos.*, Conchological Notes.

p. 233. *Greene, Rev. Carleton*, a list of marine shells obtained at Filey in August and September 1887.

p. 235. *Smith, Edgar A.*, Notes on Australian Species of Bithinia, Segmentina and Fusus, and Description of a new Melania (supralirata von Prince of Wales Island in der Torresstrasse). — Gabbia australis Tryon ist identisch mit Bithinia hyalina Brazier und in nichts von den ächten Bithinien unterschieden; da der Name bei Bithinia schon vergriffen ist, schlägt S. den neuen B. Tryoni, vor. — Fusus corpulentus Smith wird in Pricei umgetauft, eigentlich unnöthiger Weise, denn Fusus corpulentus Tryon ist eine höchst verdächtige Art.

p. 238. *Taylor, Jno. W.*, Occurence of Vertigo alpestris in Yorkshire.

p. 239. *Scharf, Robert T.*, How does a snail crawl?

p. 241. *Cooke, Alfred H.*, on a new species of sinistral Limnaea, from Central Australia, with some remarks on so-called species of Physa, also from Australia. — Neu Limnaea physopsis; die Zunge ist die einer ächten Limnaea, nicht einer Physa; auch Physa Hainesii Tryon und Ph. Newcombii Ad. et Angas sind aller Wahrscheinlichkeit nach Limnäen.

p. 244. *Smith, Edgar A.*, Description of a new Species of Conus, and a note on a white Variety of C. eburneus. — Neu C. Milesii von Muskat.

p. 249. *Hudson, B.*, Description of a new variety of Planorbis carinatus.

p. 255. *Peace, Rev. S. Spencer*, Helix lapicida var. albina.

p. 256. *Hudson, Baker*, Hoggs List of the Mollusca of the Neighbourhood of Stockton-on-Tees, with Annotations

Melvill, J., Cosmo, Mollusca. — In Handbook of Manchester. Prepared by the Local Committee for the members of the British Association, at the Manchester Meeting 1887.

Es werden 83 Arten Binnenconchylien aufgeführt, darunter von besonderem Interesse der aus Amerika eingeschleppte Planorbis dilatatus Gould.

Le Naturaliste, Année IX. No. 16.

p. 192. *Jousseaume, Dr.*, la Famille des Cancellariidae. Division des Cancellariidae. — Der Autor errichtet folgende neue Gattungen:

Bivetia für Cancellaria cancellata; — Bivetopsis für C. chrysostoma; — Ovilia für die fossile C. ovilia und wahrscheinlich C. Cumingiana und obtusa; — Ventrilia für C. bullata; — Gulia für die fossile C. acutangula. Ferner in No. 18 Scalptia für C. articularis, Calcarata für die fossile C. calcarata Br. und Sveltia für C. varicosa Br. Die Typen sind in Holzschnitt abgebildet.

p. 194 *Guerne, Jules de*, Notes sur la Faune des Açores. Diagnoses d'un Mollusque, d'un Rotifère et de trois Crustacés nouveaux. — Neu Pisidium Dabneyi aus dem Kratersee von Fayal.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Neue Folge, 30. Jahrg. 1885/86.

p. 40. *Am Stein, Dr. G.*, Nachtrag zu den bei Serneus beobachteten Binnenconchylien. Es wurden noch 16 weitere Arten beobachtet, was die Zahl der beobachteten Arten auf 48 bringt; von Interesse ist Pupa inornata Mich. —

Bulletino della Società malocologica italiana. Vol. XI. 1886. Fogli 9–15, con due tavole. — (Schluss).

p. 123. *Pantanelli, Dante*, Specie nuove di molluschi del miocene medio. (Cont.) Neu: Scalaria (Clathrus) Seguenzai p. 129 t. 5 fig. 4; — Erato incrassata Doderlein mss. p. 129 t. 5 fig. 8; — Psammobia ornatissima p. 131 t. 5 fig. 14; — Tapes inflata p. 132; — Cryptodon obliquatum p. 132 t. 5 fig. 11—12; — Lucina Isseli p. 193 t. 5 fig 13

p. 136. *Sacco, Dr. Fed.*, Rivista della Fauna malacologica fossile terrestre, lacustre e salmastre del Primonte. (Cfr. Jahrg. XIX. p. 22).

p. 204. *Pollonera, Carlo*, Note malacologiche I. Molluschi della Valle del Natisone (Friuli). Neu Zospeum Isselianum p. 205 t. 6 fig. 13; — Bythiospeum? Tellinii p. 205 t. 6 fig. 14; — Paludestrina forumjuliana p. 206 t. 14. fig. 15. 16. II. Monographia degli Sphyradium italiani. Neu Pupa ligustica p. 219 t. 6. fig. 9. 10. Es werden 11 Arten der Untergattung anerkannt. — III. Degli Odontocyclas italiani. — Auch P. Kokeilii ist von Blanc bei Malborghetto im Becken des Tagliamento gefunden worden

Proceedings of the Zoological Society of London 1887. Part II.

p. 284. *Garrett, Andrew*, on the Terrestrial Mollusks of the Viti-Islands. Part II. — Enthält die Auriculaceen und Pneumonopomen. Als neu beschrieben werden: Melampus consanguineus

p. 287; — M. crebristriatus p. 289; — M. rusticus p. 289; — M. incisus p. 289; — Truncatella avenacea p. 301; — Ostodes liberatus Mousson mss. p. 305; — O. strictus Mouss. p 306; — Omphalotropis Layardiana p 310; — Helicina Pohliana p. 313; — Hel. incisa Mouss. mss. p. 113; — Georissa juvenilis Mousson mss. p. 314. Als sehr zweifelhaft für die Inseln werden betrachtet Parmella planata, Nanina scorpio, Pupina Adamsiana, Helicina lens, Helix leucolena, Hel. semirufa, Partula taeniata, alabastrina und compressa.

p. 316. *Smith, Edgar A.*, Notes on a small Collection of Shells from the Loo Choo Islands. Eine Varietät von Hel. Largillierti ist in Holzschnitt abgebildet.

Locard, Arnould, Contributions à la Faune malacologique française. X. Monographie des espèces de la famille des Buccinidae. — In Annales Soc. Linn. Lyon 1886 p. 17.

Für Neritula neritea L. wird der Name nana Chemn. angenommen. Weiter werden als neu aufgestellt Nassa Servaini p. 41 fig. 2., N. Rochebrunei p. 43 fig. 3, beide von N. nitida Jeffr. abgetrennt; N. Bourguignati p. 49 fig. 6, N. Poirieri p. 52 fig. 7, von reticulata abgetrennt; — N. affinis Risso p. 76 fig. 10, N. cutacta p. 78 fig. 11, zu pygmaea gehörig; — N. Mabillei p. 83. = costulata var. castanea; — N. Bucquoyi p. 93; = N. madeirensis Locard nec Reeve; — Buccinum atractodeum, neuer Name für B. fusiforme Kiener wegen B. fusiforme Brod., überflüssig, da diese Art ja zu Sipho gehört; — und Bucc. Monterosatoi p. 121 fig. 15 für eine Varietät derselben. Die Symonymie wird sehr gründlich erörtert.

Smith, Edgar A., Notes on Argonauta Böttgeri. — From Annals Mag. N. H. (V) 20 p. 409—411 pl. XVII.

Die Heimath dieser von unbekanntem Fundort beschriebenen Art ist durch zwei Exemplare, welche J. F. Keene an den Chagos-Inseln lebend sammelte, sicher gestellt, in der Cuming'schen Sammlung liegt sie auch von Masbate und von Australien, auch kommt sie an Mauritius und an den chinesischen Gewässern vor. Ihre Ornamentik ist sehr veränderlich, die Zahl der Höcker schwankt von 16—33. Die Art weicht auch in der Zungenbewaffnung von Argonauta hians, deren Jugendform ihr am nächsten kommt, erheblich ab.

Für die Bibliothek eingegangen.

Bulletino della Società malacologica italiana. Vol. XIII. 1888. fogl. 1—3.

Nobre, Augusto, *Remarques sur la Faune malacologique marine des possessions portugaises de l'Afrique occidentale.* — Sep.-Abz. Vom Verfasser.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1887. Part. II.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Siebenter Band, Heft 3 u. 4.

Neue Mitglieder.

Herr *W. Schlüter*, Halle a. d. Saale, Wuchererstr. 8.

Herr *G. Nägele*, Pfarrer in Waltersweier, Post Offenburg, Baden.

Eingegangene Zahlungen.

Tietz, St. Mk. 6.—; Keyzer, M. 8.—; Ponsonby, L. 6.—; Cleve, U. 6.—; Kreglinger, K. 6.—; Miller, St. 6.—; Löbbecke D. 6.—; Heucke, D. 6.—; Ressmann, M., 5.98; — Metzger, M. 21.—; Schacko, B. 6.—; v. Martens, B. 6.—; Michael, W. 6.—; v. Monsterberg, B. 6.—; Riemenschneider, N. 6.—; Seibert, E. 6.—; Simon, St. 6.—; Eyrich, M. 6.—; Loretz, B. 6.—; Goldfuss, H. 6.—; Schmidt, W. 6.—; Schröder, N. 6.—; Fürst Salm-Salm A. 6.—; Dickin, W. 5.96; — Jetschin, P. 6.—; Bachmann, L. 6.—; Rohrmann, B. 6.—; Konow, F. 6.—; v. Vest, H. 6.—; Brancsik, T. 6.—; Naturf. Gesellschaft, Görlitz 6.—; Pfeffer, H. 6.—; Jenisch, O. 6.—; Clessin, O. 8.—; Ankarcrona, C. 6.—; Kohlmann, V. 6.—; Kuhn, O. 6.—; v. Koch, B. 6.—; de Laval, S. 6.—; Borcherding, V. 6.—; Gysser, K. 6.—; Lehmann, K. 6.—; Schlüter, H. 6.—; Kunze, Th. 6.—; Strubell, F. 6.—; Schmidt, M. 6.—; Nägele, W. 6.—; Dybowski, N. 5.16; — Killias, C. 6.—; Graf Degenfeld-Schönburg, St. 6.—; Puppe, W. 6.—; Brüller, L. 6.—; Wesley & Son, L. 5.69; — Riise, K. 27.—; Hesse, V. 6.—; Gloyne, M. 6.—; Besselich, T. 6.—; Pfeffer, H. 6.—; Reinhardt, B. 6.—; Wiegmann, J. 6.—.

Redigirt von Dr. W. Kobelt. — Druck von Kumpf & Reis in Frankfurt a. M.
Verlag von Moritz Diesterweg in Frankfurt a. M.